



INFOS-INTOX PARENTS

Le repas de famille dure trois à quatre heures : je fractionne la prise des gélules d'enzymes pancréatiques de mon enfant.



Quand on a la mucoviscidose, le pancréas fabrique des enzymes pancréatiques en trop grande quantité.



L'examen ECBC sert à analyser les bactéries du mucus.



Ajouter du sucre dans l'alimentation évite la déshydratation.



INFOS-INTOX PARENTS

La kiné respiratoire est utile même si mon enfant n'est pas encombré.



En cas d'oubli des enzymes pancréatiques au moment du repas, il est possible de les prendre trois heures après.



Deux personnes atteintes de mucoviscidose se trouvant à moins d'1m50 l'une de l'autre, augmentent leur risque de contamination infectieuse.



Un petit paquet de chips est plus gras qu'un demi-avocat avec mayonnaise.



INFOS-INTOX PARENTS

Un enfant ayant la mucoviscidose se déshydrate vite.



Un aérosol de colimycine ou de tobi peut se remplacer par un aérosol de pulmozyme.



Le projet d'accueil individualisé est conseillé à l'entrée en maternelle, CP, collège, lycée.



Le cannabis est moins dangereux que le tabac dans la mucoviscidose.



INFOS-INTOX PARENTS


Nantes est la 6ème ville de France.



Au bout de 8 jours, on peut arrêter les antibiotiques si mon enfant va mieux.



Le premier film des frères Lumière s'appelle « la sortie des usines lumières ».



Si on garde son poisson rouge dans le noir, il se met à pleurer.



INFOS-INTOX PARENTS

Il y a deux trous dans une boule de bowling.



John Travolta a inventé la pile électrique en 1800.

